
Kreuzworträtsel zum Thema Fehlbildungen im Magen-Darm-Trakt

Lösen Sie das Kreuzworträtsel in Einzelarbeit!



Horizontal →

- 1: Steriler Sack zum Aufhängen
- 3: Dient als Mund-Nasen-Trennung
- 5: Kinder mit einer Pylorusstenose fallen häufig dadurch auf
- 7: Muss immmer funktionsfähig und einsatzbereit sein
- 8: Vermehrter Speichelfluss, wiederholtes Verschlucken, Husten. Die Verdachtsdiagnose lautet:
- 9: Kann Druckstellen verursachen
- 11: Bauchwanddefekt bei dem die Organe in die Nabelschnur hineingelagert sind
- 13: Sollte nach allen OP's langsam erfolgen
- 15: Ist nach operativen Eingriffen wichtig
- 17: Wichtiger Aspekt bei der Versorgung von Kindern mit LKG
- 19: Spezieller Sauger für Kinder mit Saugbehinderung
- 20: Problembereich bei einem Kind mit LKG
- 21: Das Stillen und Flasche geben bei LKG sollte in Position geschehen

Vertikal ↓

- 2: Gefahr bei einer Ösophagusatresie
- 4: Besonders wichtig bei Kindern mit einer Spaltbildung
- 6: Wird zum Schutz der Wunde und des Ziehen der Magensonde gemacht
- 9: Verengung von Hohlorganen
- 10: Mündungen von Hohlorganen
- 12: Haben Eltern häufig aufgrund der Fehlbildung und äußeren Erscheinung
- 14: Erbrechen im Strahl
- 16: Unterbrechung der organischen Entwicklung, bei dem es zu einem vorzeitigen Stillstand der Organentwicklung kommt
- 18: Auf Ein- und Ausfuhr achten

Kreuzworträtsel zum Thema Fehlbildungen im Magen-Darm-Trakt | LÖSUNG

Lösen Sie das Kreuzworträtsel in Einzelarbeit!

																								19 H	А	18 B	Е	R	М	Α	N	
	13 N	12 A	Н	R	U	N	G	14 S	А	U	F	В	А	U						16 H						ı						_
		К						С									17 E	L	Т	Е	R	N	В	Е	G	L	Е	ı	Т	U	N	G
		Z						Н												М						Α						
		Е						W												М						N						
		Р						15 A	N	А	L	G	0	S	Е	D	ı	Е	R	U	N	G				Z						
		Т						L												N						I						
		Α						L												G				20 H	0	Е	R	Е	N			
		N						Α												S						R						
		Z						R												В						U						
		Р						Т												I						N						
		R						I												L						G						
		0						G						2 A						D												
		В												1 S	ı	L	0		21 A	U	F	R	Е	С	Н	Т	Е	R				
		L												Р						N												
		Е												1						G												
	11 O	М	Р	Н	10 A	L	0	С	Е	L	Е			R																		
		Е			Т								3 G	А	U	4 M	Е	N	Р	L	А	Т	Т	Е								
					R									Т		U																
					Е									ı		N																
					S									0		D		6 F														
					ı									N		Р		ı														
9 S	С	н	L	U	Е	R	F	S	0	N	D	Е				F		Х														
Т																L		ı														
Е															5 G	Е	D	Е	ı	Н	S	Т	0	Е	R	U	N	G				
N																G		R														
8 O	Е	S	0	Р	Н	Α	G	U	S	А	Т	R	Е	S	ı	Е		U														
S																		N														
E													7 A	В	S	А	U	G	U	N	G											

Horizontal →

- 1: Steriler Sack zum Aufhängen
- 3: Dient als Mund-Nasen-Trennung
- 5: Kinder mit einer Pylorusstenose fallen häufig dadurch auf
- 7: Muss immmer funktionsfähig und einsatzbereit sein
- 8: Vermehrter Speichelfluss, wiederholtes Verschlucken, Husten. Die Verdachtsdiagnose lautet:
- 9: Kann Druckstellen verursachen
- 11: Bauchwanddefekt bei dem die Organe in die Nabelschnur hineingelagert sind
- 13: Sollte nach allen OP's langsam erfolgen
- 15: Ist nach operativen Eingriffen wichtig
- 17: Wichtiger Aspekt bei der Versorgung von Kindern mit LKG
- 19: Spezieller Sauger für Kinder mit Saugbehinderung
- 20: Problembereich bei einem Kind mit LKG
- 21: Das Stillen und Flasche geben bei LKG sollte in Position geschehen

Vertikal ↓

- 2: Gefahr bei einer Ösophagusatresie
- 4: Besonders wichtig bei Kindern mit einer Spaltbildung
- 6: Wird zum Schutz der Wunde und des Ziehen der Magensonde gemacht
- 9: Verengung von Hohlorganen
- 10: Mündungen von Hohlorganen
- 12: Haben Eltern häufig aufgrund der Fehlbildung und äußeren Erscheinung
- 14: Erbrechen im Strahl
- 16: Unterbrechung der organischen Entwicklung, bei dem es zu einem vorzeitigen Stillstand der Organentwicklung kommt
- 18: Auf Ein- und Ausfuhr achten